La en
Hemofili
sangre qu
cit de algun
gulación de la
Las personas qu
sangrados internos
y también externos durar
período más mucho más prol
Actualmente, el único tratar
to es la administración intrav
del factor de coagulación def
que padece el afectado. Est
se obtiene de las donacione
gre a través del plasma
su elaboración en el prop

la **MUJER** la que transmi
pre al hijo, durante el período
gestación o bien por mutació
genética, es decir, que no tiene
haber antecedentes familiares. En l
trasmisión genética, una trasmisió

en la **HEMOFILIA** a sus hijos
varones, en un 50% de probabilida-
des, un hemofílico puede trasmitir el
gen en defectuoso a sus hijas, sien

nuevas **PORTADORAS**. Exist
dos tipos, una es el tipo A (factor d
ficit VIII) y el tipo B (factor déficit
La tipología comprende tres gr
(leve, moderado o grave), qu
referencia a la mayor o m
vedad de la enferm
existen otras coag
nitas, como el Von
nogenemia, etc., c

A·H·E·T·E
Asociación de Hemofilia en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife

UNA HISTORIA POR CONTAR

COLABORA:

Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia
Gobierno de Canarias

ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, AHETE
Camino del Hierro, 120 Viviendas. Bloque 1, local 1 y 3. 38009 Santa Cruz de Tenerife
Tel./Fax 922 649 654 info@hemofiliatenerife.org www.hemofiliatenerife.org